



Entre les Levées Saint-Père-sur-Loire (Loiret)



Habitats

- ◆ Communauté à potamois et myriophylles
- ◆ Roselière à Baldingère et peuplement à grandes laïches
- ◆ Mégaphorbiaie eutrophe
- ◆ Communauté pionnière des vases exondées et des berges vaseuses
- ◆ Friche héliophile sur sables à Onagre
- ◆ Prairies de fauche à Avoine élevée et Chiendent du lit majeur de Loire
- ◆ Lande à genêt à balai et à genêt purgatif
- ◆ Friche à Tanaïs et Cirses
- ◆ Pelouses à Sedum du lit majeur, Corynéphore blanchâtre, Fétuque à longues feuilles
- ◆ Saulaie arbustive du lit mineur
- ◆ Forêt alluviale de Loire à Saule blanc et Peuplier noir
- ◆ Fruticées et ronciers
- ◆ Chênaie pédonculée ligérienne
- ◆ Pinède, Robineraie
- ◆ Fruticées et ronciers
- ◆ Haie bocagère mixte
- ◆ Friches à Tanaïs et Cirses

Statuts-inventaires

- ◆ Z.I.C.O. n°CE 17 « Vallée de la Loire : Orléanais »
- ◆ ZNIEFF type I n°240003900 « Pelouses et lit mineur d'Entre-les-Levées »
- ◆ ZSC FR2400528 « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire »
- ◆ ZPS FR2410017 « Vallée de la Loire du Loiret »


Flore remarquable

- ◆ Laïche de Loire (*Carex ligERICA*) et Laïche précoce (*Carex praecox*)
- ◆ Corynéphore blanchâtre (*Corynephorus canescens*)
- ◆ Genêt purgatif (*Cytisus oromediterraneus*)
- ◆ Lupin à feuilles étroites (*Lupinus angustifolius* subsp. *reticulatus*)
- ◆ Renoncule de Montpellier (*Ranunculus montpelliericus*)
- ◆ Herbe de St-Roch (*Pulicaria vulgaris*)
- ◆ Scrophulaire des chiens (*Scrophularia canina*)
- ◆ Armoise champêtre (*Artemisia campestris*)
- ◆ Ail à tête ronde (*Allium sphaerocephalon*)

Faune remarquable

- ◆ Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia* Rottembourg)
- ◆ Gompocère tacheté (*Myrmeleotettix maculatus*)
- ◆ Gomphe serpentini (*Ophiogomphus cecilia*)
- ◆ Oedipode aigue marine (*Sphingonotus caeruleans*)
- ◆ Zygène du Panicaut (*Zygaena sarpedon*)
- ◆ Castor d'Europe (*Castor fiber*)

En rive droite de la Loire se trouve le site naturel d'« Entre les levées » à Saint-Père-sur-Loire, ouvrant la porte du Méandre de Guilly. En plus de la mosaïque caractéristique des milieux naturels ligériens, ce site bénéficie d'un sol très sableux et de conditions climatiques particulièrement chaudes, à la faveur desquelles prospèrent la Renoncule de Montpellier, le Genêt purgatif (plus répandu dans les Cévennes), une vaste pelouse à Orpins et à Corynéphore blanchâtre, où les criquets et sauterelles retrouvent des conditions quasi-méditerranéennes...



Localisation

Val de Loire dans le Loiret, commune de St-Père-sur-Loire, à l'amont du Méandre de Guilly, rive droite.

Milieux naturels

Ensemble de pelouses sèches, prairies mi-sèches sur la 1^{ère} terrasse et mosaïque de milieux alluviaux dans le lit majeur de la Loire, des grèves sableuses à la saulaie-peupleraie.

Superficie et type de maîtrise

19,35 hectares acquis par le Conservatoire en 1994. Une demande d'Autorisation d'occupation temporaire du Domaine public fluvial a été faite auprès des services de l'Etat gestionnaires des bords de Loire, afin d'englober les grèves et pelouses sableuses dans la gestion.



Plan de gestion pour la période 2011-2019 (2^e plan de gestion du site).

La Loire, une note de Méditerranée en plus

Le site naturel d'Entre les levées abrite 12 habitats naturels à forte valeur patrimoniale, typiques du Val de Loire et la faune et la flore qui les accompagnent. Reposant sur un sol sableux s'échauffant très vite et très drainant, une flore et une faune « xérophiles » (affectonnant la sécheresse) adaptées à ces conditions se sont installées. La végétation la plus intéressante se retrouve essentiellement sur les pelouses à Fétuque à longue feuille, les pelouses à Orpins et à Corynéphore blanchâtre et les grèves sableuses du bord de Loire.

Ainsi la Renoncule de Montpellier (*Ranunculus montpelliericus*), beau Bouton d'Or qui doit son nom à son aire d'origine, ne fleurit régulièrement dans le Loiret qu'à Entre les levées, où il trouve suffisamment de chaleur lors de sa croissance. Autre visiteur du Sud, le Genêt purgatif (*Cytisus oromediterraneus*), formant dans les Cévennes de vastes étendues de lande sur les coteaux pâturés, est aussi présent localement.

Chez les insectes, le Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia*, protégé en France), papillon plutôt habitué aux prairies humides, demeure à St-Père sous la forme d'une sous-espèce adaptée aux milieux secs. Le sphinx de l'Euphorbe à la chenille multicolore et la Zygène du Panicaut témoignent aussi de la richesse des milieux secs d'Entre les levées et de la nécessité de leur préservation.



De gauche à droite : Renoncule de Montpellier, Ail à tête ronde, chenille du Sphinx de l'Euphorbe, Genêt purgatif